

適応疾患/胃癌

プロトコール名 P-G-13 / 胃癌ラムシルマブ+パクリタキセル療法

薬剤名・用量	備考	投与方法	投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1
レスタミン錠 5錠		開始直後	Day	↓							↓							↓														↓
① 生食50mL		ルート確保		↓							↓							↓														↓
② グラニセトロンバッグ 3mg デキサート 6.6mg ファモチジン 20mg	30分	点滴静注		↓							↓							↓														↓
③ 生食50mL	フラッシュ			↓														↓														↓
④ ラムシルマブ(RAM) 8mg/kg 生食250mL 蛋白質透過型フィルター(0.2、0.22ミクロン)が必要	60分	点滴静注		↓														↓														↓
⑤ 生食(経過観察,フラッシュ用) RAM1~4回目の投与でinfusion reactionがなければ、短縮可能	60分			↓														↓														↓
⑥ パクリタキセル(PTX) 80mg/m² 5%ブドウ糖液250mL ポンプ専用フィルター付き輸液セット使用	60分	点滴静注		↓							↓							↓														↓
⑦ 生食50mL	フラッシュ			↓							↓							↓														↓

* 1クール28日間隔