

# 適応疾患／胃がん

プロトコール名 **P-G-8 / トラスツズマブ+シスプラチン+フルオロウラシル療法**

薬剤名・一日用量	備考	投与方法	投与日 Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
① ラクテック 500mL	120分	点滴静注		↓																				
② <b>ハーセプチン 初回 8mg/kg</b> <b>2回目以降6mg/kg</b> 生食250mL	90分 (2回目以降30分に短縮可)	点滴静注		↓																				
③ ラクテック 500mL	120分	点滴静注		↓																				
④ アロキシバッグ 0.75mg デキサート 13.2mg	15分	点滴静注		↓																				
⑤ <b>プリプラチン 80mg/m<sup>2</sup>/day</b> 生食 500mL	120分	点滴静注		↓																				
⑥ ラシックス注20mg		静注		↓																				
⑦ ラクテック 500mL	120分	点滴静注		↓																				
⑧ ラクテック 500mL	120分	点滴静注		↓																				
⑨ <b>5-FU 800mg/m<sup>2</sup>/day</b> 5%ブドウ糖 適宜	24時間	持続静注 (ディスポーザブル 注入ポンプ使用)		↓	↓	↓	↓	↓																
⑩ デキサート 6.6mg 生食100mL	15分	点滴静注			↓	↓	↓	↓																

\* 1クール21日間