

適応疾患/乳がん

プロトコール名 **P-M-7-A / AC 療法**

使用薬剤	備考	投与方法	投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1	2	3	4	…
			Day																										
① グラニセトロンバッグ デキサート6. 6mg	30分	点滴静注		↓																					↓				
				↓																					↓				
② ドキソルビシン塩酸塩注射液「サンド」 60mg/m² 生食50mL	15分	点滴静注		↓																					↓				
				↓																					↓				
③ エンドキサン 600mg/m² 生食100mL	30分	点滴静注		↓																					↓				
				↓																					↓				
④ プリンペラン 1A ソリタT ₃ 200mL	30分	点滴静注		↓																					↓				
				↓																					↓				

* 1コース21日(1投2休)

プロトコール名 **P-M-7-B / AC分割 療法**

使用薬剤	備考	投与方法	投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1	2	3	4	…
			Day																										
① グラニセトロンバッグ デキサート6. 6mg	30分	点滴静注		↓																					↓				
				↓																					↓				
② ドキソルビシン塩酸塩注射液「サンド」 60mg/m² 生食50mL	15分	点滴静注		↓																					↓				
				↓																					↓				
③ プリンペラン 1A ソリタT ₃ 200mL	30分	点滴静注		↓																					↓				
				↓																					↓				
④ エンドキサン錠 100mg/m²	day1-7 (day8-21は休薬)	経口		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓															↓	↓	↓	↓	…

* 1コース21日(1投2休)

注意：ドキソルビシンは総投与量500mg/m²まで