

適応疾患/大腸がん

プロトコール名 **P-R-14 / Panitumumab+mFOLFOX6療法**

薬剤名・用量	備考	投与方法	投与日 Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8
レスタミン錠10mg ナゼアOD錠	5錠 2錠	経口 経口		↓														↓							
① アロキシバッグ 0.75mg デキサート 6.6mg	15分	点滴静注		↓														↓							
② 生食50mL	全開	点滴静注		↓														↓							
③ ベクティビックス 6mg/kg 生食100mL インラインフィルター使用	60分	点滴静注		↓														↓							
④ 生食50mL	全開	点滴静注		↓														↓							
⑤ レボホリナート 200mg/m² 5%ブドウ糖液250mL	120分 (⑤⑥同時)	点滴静注		↓														↓							
⑥ エルプラット 85mg/m² 5%ブドウ糖液250mL	120分 (⑤⑥同時)	点滴静注		↓														↓							
⑦ 5-Fu 400mg/m² 生食50mL	全開で	急速静注 bolus		↓														↓							
⑧ 生食50mL	フラッシュ			↓														↓							
⑨ 5-Fu 2400mg/m² 5%ブドウ糖液 適量	46時間 シュアフューザー	持続静注 conti		↓														↓							



* 1クール14日間隔