

適応疾患/大腸がん

プロトコール名 **P-R-15 / Panitumumab + FOLFIRI療法**

薬剤名・用量	備考	投与方法	投与日 Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8
レスタミン錠10mg 5錠 ナゼアOD錠 2錠		経口 経口		↓														↓							
① アロキシバッグ 0.75mg デキサート 6.6mg	15分	点滴静注		↓														↓							
② 生食50mL	全開	点滴静注		↓														↓							
③ ベクティビックス 6mg/kg 生食100mL	60分	点滴静注		↓														↓							
	インラインフィルター使用			↓														↓							
④ 生食50mL	全開	点滴静注		↓														↓							
⑤ レボホリナート 200mg/m² 5%ブドウ糖液250mL	120分 (⑤⑥同時開始)	点滴静注		↓														↓							
⑥ イリノカン塩酸塩点滴静注液 150mg/m² 5%ブドウ糖液250mL	90分 (⑤⑥同時開始)	点滴静注		↓														↓							
⑦ 5-Fu 400mg/m² 生食50mL	全開で	急速静注 bolus		↓														↓							
⑧ 生食50mL	フラッシュ			↓														↓							
⑨ 5-Fu 2400mg/m² 5%ブドウ糖液 適量	46時間 シユアフューザー	持続静注 conti		↓														↓							
				↓														↓							

* 1クール14日間隔