

# 適応疾患/大腸がん

プロトコール名 **P-R-16** / **Bevacizumab+FOLFIRI療法**

薬剤名・用量	備考	投与方法	投与日 Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8
① 生食50ml	ルート確保	点滴静注		↓														↓							
② アロキシバッグ 0.75mg デキサート 9.9mg	15分	点滴静注		↓														↓							
③ <b>アバステン 5mg/kg</b> 生食100mL	90分	点滴静注		↓														↓							
④ <b>レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup></b> 5%ブドウ糖液250mL	120分 (④⑤同時開始)	点滴静注		↓														↓							
⑤ <b>イリノテカン塩酸塩点滴静注液 150mg/m<sup>2</sup></b> 5%ブドウ糖液250mL	90分 (④⑤同時開始)	点滴静注		↓														↓							
⑥ <b>5-Fu 400mg/m<sup>2</sup></b> 生食50mL	全開で	急速静注 bolus		↓														↓							
⑦ <b>5-Fu 2400mg/m<sup>2</sup></b> 5%ブドウ糖液 適量	<b>46時間</b> シユアフューザー	<b>持続静注</b> conti		↓														↓							



\* 1クール14日間隔