

適応疾患/大腸がん

プロトコール名 **P-R-18 / bevacizumab+XELIRI療法**

薬剤名・用量	備考	投与方法	投与日 Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
① 生食50ml	ルート確保	点滴静注		↓																				
② グラニセトロンバッグ デキサート 9.9mg	30分	点滴静注		↓	↓																			
③ アバステン 7.5mg/kg 生食100ml	90分~30分	点滴静注		↓	↓																			
④ 生食50ml	フラッシュ																							
⑤ イリノテカン 200mg/m²※ 5%ブドウ糖液250ml	90分	点滴静注		↓	↓																			
⑥ 生食50ml	フラッシュ			↓																				
ゼローダ800mg/m²/回	<u>1日2回</u>	内服		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

* 1クール21日間隔

ゼローダはday1(夕)から服用開始、day15(朝)で終了。休薬はday21まで。

※以下のUGT1A1遺伝子多型を有する場合の開始量は150mg/m²
*6ホモ接合体、*28ホモ接合体、*6及び28ダブルヘテロ接合体