

# 適応疾患/大腸がん

プロトコール名 **P-R-9 / bevacizumab+XELOX療法**

薬剤名・用量	備考	投与方法	投与日 Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
① 生食50ml	ルート確保	点滴静注		↓																				
② <b>アバステン 7.5mg/kg</b> 生食100ml	90分~30分	点滴静注		↓																				
③ グラニセトロンバッグ デキサート 13.2mg	30分	点滴静注		↓																				
④ <b>エルプラット 130mg/m<sup>2</sup></b> 5%ブドウ糖液250ml	120分	点滴静注		↓																				
⑤ 生食50ml	フラッシュ			↓																				
<b>ゼローダ2000mg/m<sup>2</sup></b>	2回分服	内服		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

\* 1クール21日間隔

ゼローダ錠300mg（経口）

用法用量：C法（治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌）

体表面積	ゼローダ 1回用量※
~<1.36m <sup>2</sup>	1,200mg(4錠)
1.36 ≤ ~<1.66m <sup>2</sup>	1,500mg(5錠)
1.66 ≤ ~<1.96m <sup>2</sup>	1,800mg(6錠)
1.96 ≤ ~	2,100mg(7錠)

※ 1日2回投与(朝・夕)